Nimbus® CS

La force irrésistible du désherbage en un seul passage



Profil produit

Substances actives	250 g/l Métazachlore 33.3 g/l Clomazone (micro-encapsulé)
Formulation	Suspension concentrée (CS)
Mode d'action	Herbicide racinaire, absorption par les racines des dicotylédones et graminées
Dose recommandée	3.0 l/ha
Volume d'eau nécessaire	250–300 l/ha
Tolérance des cultures	■ Très bonne jusque 25–30 mm de précipitations après semis ■ Très bonne même par températures de sol élevées
Stade de l'application	Pré-levée: 0–5 jours après semis


Tabouret des champs



Capselle


Sisymbre officinal


Gaillet gratteron

Recommandation d'application pour le colza

Champ d'action étendu incluant les différentes variétés de laiteron, capselle et tabouret des champs



BASF
We create chemistry

Les avantages en un coup d'oeil

- Une formulation optimisée pour une meilleur sélectivité (micro-encapsulation)
- Champ d'action étendu
- Utilisation indépendante de la nature du sol et des intempéries
- La solution contre laiteron, capselle, tabouret etc

Manipuler les produits phytosanitaires avec précautions. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation. Tenir compte des conseils et des symboles d'avertissement.

Focus® Ultra

L‘anti-graminée universel



Profil produit


Substances actives	100 g/l Cycloxydime
Formulation	Concentré émulsionnable (EC)
Modes d‘action	Action foliaire (systémique), inhibition de l‘AcetylCoA-Carboxylase (ACCase), mode d‘action (groupe HRAC): A
Spectre d‘action	Graminicide luttant contre les repousses de céréales et graminées. En tant qu‘agent DIM, il agit également sur les métabolismes de biotype ACCase résistant.
Volume d‘eau nécessaire	100–250 l/ha
Stade d‘application	Idéal du stade 2 feuilles étalées jusque fin tallage des repousses de céréales et graminées
Cultures autorisées	Colza, betterave, pomme de terre, féverole, soja, maïs tolérant la cycloxydin (Duo-Maïs), etc







Recommandation d‘application pour le colza



Doses recommandées en conditions optimales de traitement avec Focus® Ultra:

Agrostide, sétaires, digitaire sanguine, digitaire filiforme	1.5 l/ha
Vulpin des champs, repousses d‘orge, folle avoine	1.75 l/ha
Repousses de blé, seigle, triticale, bromus, ivraie	2.0 l/ha
Chiendent	5.0 l/ha**

Les avantages en un coup d‘oeil

- Spectre d‘action large contre les graminées, Bromes inclus
- Lutte contre les repousses de céréales
- Agit même en conditions climatiques fraîches (< 10 °C)
- Ne pose pas de problème en mélange dans la cuve

BASF
We create chemistry

** La dose globale à appliquer, doit l‘être en plusieurs fois (2 fois 2.5 l/ha). Nous attirons votre attention sur le fait que selon les homologations, la dose maximale autorisé dans le maïs et le kénaf est de 4.0 l/ha. Toute diminution de dosage entraine une diminution d‘efficacité.

Manipuler les produits phytosanitaires avec précautions. Toujours lire l‘étiquette et les informations sur le produit avant l‘utilisation. Tenir compte des conseils et des symboles d‘avertissement.