Istruzioni per l'uso

N. federale di omologazione: W 7341

DAGONIS®

Fungicida

Principi attivi: **75,0 g/l Fluxapyroxade (Xemium®) (% in peso: 6,98)**
50,0 g/l Difenoconazolo (% in peso: 4,66)

Formulazione: **Sospensione concentrata (SC)**

Meccanismo d'azione (gruppo FRAC): Fluxapyroxade: C2 (7), Difenoconazolo: G1 (3)

Fungicida liquido ad azione preventiva per il controllo di Peronospora, maculature fogliari di origine fungina, Rizottonia e Sclerotinia su numerosi ortaggi, patate e fragole

APPLICAZIONE

Modalità d'azione

Dagonis è un nuovo fungicida ad azione combinata a base dei due principi attivi Xemium e Difenoconazolo. La sinergia dei due principi attivi combatte in modo sicuro e a lungo patologie fungine come Peronospora, maculature fogliari di origine fungina, Rizottonia, Sclerotinia e Alternariosi su ortaggi, patate e fragole.

Dagonis è particolarmente adatto per applicazioni preventive e alla prima infezione per evitare la diffusione nella cultura.

In molti casi all'uso di fungicidi è associato in generale il rischio dell'insorgenza di ceppi fungini resistenti ai principi attivi. Pertanto, in condizioni particolarmente sfavorevoli, non si può escludere una variazione dell'efficacia del prodotto. Il dosaggio raccomandato da BASF deve essere rigorosamente rispettato.

Indicazioni per evitare l'insorgere di resistenze

Il modo più efficace per contrastare l'insorgere di resistenze è debellare l'agente patogeno. Si devono adottare inoltre tutte le misure agronomiche atte a ridurre il rischio di infezione e prestare la massima attenzione all'adozione della corretta tecnica di applicazione. Per i funghi patogeni da tenere sotto controllo per un periodo di tempo più lungo è indispensabile alternare correttamente diversi principi attivi. Informazioni sui meccanismi di efficacia dei principi attivi contenuti nel prodotto sono indicate sulla prima pagina delle istruzioni per l'uso. Raccomandiamo di prestare sempre attenzione anche alle indicazioni del nostro servizio di consulenza.

Tollerabilità da parte delle colture

Ai dosaggi raccomandati Dagonis secondo lo stato attuale delle conoscenze è ben tollerato da tutte le colture.
OSSERVAZIONE IMPORTANTE: Per l'applicazione su ortaggi e bacche non sono disponibili informazioni derivanti dall'esperienza pratica per tutte le varietà disponibili sul mercato. Alla prima applicazione in ogni coltura è necessario per prima cosa verificare su una porzione della superficie la tollerabilità da parte delle colture nelle particolari condizioni in cui si opera.

AMBITI DI APPLICAZIONE E RACCOMANDAZIONI

Fragole

contro Oidio della fragola *(Sphaerotheca macularis)*

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 3 trattamenti per coltura e anno.

Tempo di attesa: 1 giorno

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 11 a 81.

Baby-Leaf (Chenopodiaceae) (pieno campo)

contro Mal dello sclerozio e Rizottonia

Dose: **2 l/ha**

Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

Tempo di attesa: 14 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 18.

Valerianella, Rucola (pieno campo)

contro Mal dello sclerozio e Rizottonia

Dose: **2 l/ha**

Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

Tempo di attesa: 14 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa (pieno campo)

contro *Alternaria* spp. e Maculatura anulare del cavolo

Dose: **1 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 14 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Cipollotti a mazzi, Porro (pieno campo)

contro Alternariosi e Ruggine delle Aglicaee

Dose: **1 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 14 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 13 a 49.

Cicoria belga (pieno campo):

contro Oidio delle Asteracee

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 7 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Piselli (pieno campo)

Contro Antracnosi del pisello

Dose: **2 l/ha**

Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

Tempo di attesa: 7 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Piselli con baccello (pieno campo)

contro Mal dello sclerozio, Ruggini del pisello

Dose: **2 l/ha**

Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

Tempo di attesa: 7 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 15 a 77.

Spinaci, Bietola, Portulaca estiva (pieno campo)

contro Maculature fogliari

Dose: **1 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 14 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Insalate del genere Lactuca (pieno campo)

contro Mal dello sclerozio

Dose: **2 l/ha**

Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

Tempo di attesa: 14 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Rafano rusticana, Ravanello, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa e B. napus (pieno campo):

contro Maculatura anulare nera del cavolo

Dose: **1 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 7 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Barbabietola (pieno campo):

contro Oidio delle barbabietole

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 7 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Barbabietola (uso del foglio) (pieno campo)

contro Maculature fogliari

Dose: **1 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 14 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Barbabietola, Topinambur (pieno campo):

contro Mal dello sclerozio

Dose: **2 l/ha**

Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

Tempo di attesa: 7 giorni

Il primo trattamento si esegue all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi negli stadi BBCH da 12 a 49.

Melanzana, Peperone, Pomodori in serra

contro Oidio delle *Solanaceae*

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 3 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Melanzana, Peperone, Pomodori in serra

contro Alternariosi delle solanacee

Dose: **1 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 3 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Cucurbitacee in serra

contro Cancro gommoso

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 3 trattamenti per coltura con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 3 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Cucurbitacee

contro Oidio delle cucurbitacee

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 3 trattamenti per coltura con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 3 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Sedano rapa

Contro Mal dello sclerozio

Dose: **2 l/ha**

Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

Tempo di attesa: 7 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Sedano rapa

contro Oidio delle carote

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 7 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Sedano rapa, Scorzonera

contro *Alternaria spp.*

Dose: **1 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 7 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Scorzonera

contro Oidio delle Asteracee

Dose: **0.6 l/ha**

Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno con un intervallo di almeno 7 giorni.

Tempo di attesa: 7 giorni

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

Patate

contro Alternariosi delle solanacee

Dose: **0.75 l/ha**

Al massimo 4 trattamenti per coltura.

Tempo di attesa: 14 giorni

Per le patate precoci è necessario rispettare un tempo di attesa di 1 settimana.

Trattamento all'inizio dell'infezione ovvero alla comparsa dei primi sintomi.

USI APPROVATI

Ambito di applicazione	Agente patogeno/efficacia	Utilizzo nel rispetto di	(*)
Coltivazione di bacche			
Fragole	Oidio della fragola	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 1 giorno Applicazione: stadio 11-81 (BBCH)	1,2,3,4
Ortaggi			
Pieno campo: Baby-Leaf (Chenopodiaceae)	Mal dello sclerozio Rizottonia	Dose: 2 l/ha Tempo di attesa: 14 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,5,6
Pieno campo: Valerianella, Rucola	Mal dello sclerozio Rizottonia	Dose: 2 l/ha Tempo di attesa: 14 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,5,6
Pieno campo: Barbabietola (uso del foglio)	Maculature fogliari	Dose: 1 l/ha Tempo di attesa: 14 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,6,7, 8,9
Pieno campo: Barbabietola, Topinambur	Mal dello sclerozio	Dose: 2 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,5,6
Pieno campo: Barbabietola	Oidio delle barbabietole	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,6,7,8

Ambito di applicazione	Agente patogeno/efficacia	Utilizzo nel rispetto di	(*)
Pieno campo: Spinaci, Bietola, Portulaca estiva	Maculature fogliari	Dose: 1 l/ha Tempo di attesa: 14 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,6,7,8
Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Scorzonera, Sedano rapa	Alternaria spp.	Dose: 1 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,7,8
Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Sedano rapa	Mal dello sclerozio	Dose: 2 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,5
Carote, Finocchio dolce, Pastinaca, Sedano rapa	Oidio delle carote	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,7,8
Pieno campo: Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa	Alternaria spp. Maculatura anulare del cavolo	Dose: 1 l/ha Tempo di attesa: 14 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,7,8
Pieno campo: Cicoria belga	Oidio delle Asteracee	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,6,7,8
Pieno campo: Cipollotti a mazzi, Porro	Alternariosi (Alternaria porri) Ruggine delle Aglicaee (Puccinia allii)	Dose: 1 l/ha Tempo di attesa: 14 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,6,7,8

Ambito di applicazione	Agente patogeno/efficacia	Utilizzo nel rispetto di	(*)
Serra: Cucurbitacee	Cancro gommoso	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 3 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,3,10, 11
Cucurbitacee	Oidio delle cucurbitacee	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 3 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,3,10, 11
Pieno campo: Insalate del genere Lactuca	Mal dello sclerozio	Dose: 2 l/ha Tempo di attesa: 14 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,5
Serra: Melanzana, Peperone, Pomodori	Alternariosi delle solanacee	Dose: 1 l/ha Tempo di attesa: 3 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,3,7, 8,10
Serra: Melanzana, Peperone, Pomodori	Oidio delle Solanaceae	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 3 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,3,7, 8,10
Pieno campo: Piselli	Antracnosi del pisello	Dose: 2 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,5
Pieno campo: Piselli con baccello	Mal dello sclerozio Ruggini del pisello	Dose: 2 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,5,6

Ambito di applicazione	Agente patogeno/efficacia	Utilizzo nel rispetto di	(*)
Pieno campo: Rafano rusticana, Ravanello, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa e B. napus	Maculatura anulare nera del cavolo	Dose: 1 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,6,7,8
Scorzonera	Oidio delle Asteracee	Dose: 0.6 l/ha Tempo di attesa: 7 giorni Applicazione: A partire dall'inizio dell'infezione o dall'apparizione dei primi sintomi	2,7,8
Colture in pieno campo			
Patate	Alternariosi delle solanacee	Dose: 0.75 l/ha Tempo di attesa: 2 settimana/e	2,12, 13

CONDIZIONI GENERALI/AGRONOMICHE:

1 La dose indicata si riferisce allo stadio “piena fioritura fino all’inizio dell’arrossamento dei frutticini”, 4 piante/m^2, trattamento con una quantità di poltiglia di 1000 l/ha. La dose va adattata allo stadio della coltura da trattare in base alle istruzioni del Servizio di omologazione.

4 SPa 1: per evitare l’insorgenza di resistenza al massimo 3 trattamenti per anno e coltura con prodotti delli gruppi di principi attivi FRAC numero 3 (DeMethylation Inhibitors, DMI = inibitori della sintesi degli steroli, ISS) o FRAC numero 7 (Succinate Dehydrogenase Inhibitors, SDHI).

5 Al massimo 1 trattamento per coltura e anno.

6 Autorizzato come uso minore secondo l’art. 35 OPF (minor use).

7 Al massimo 2 trattamenti per coltura e anno. Trattamenti ad intervalli di almeno 7 giorni.

8 Trattamenti con un intervallo di almeno 7 giorni.

9 Per uso fogliare (consumo delle foglie).

10 Spe 3: per proteggere gli organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 m dalle acque superficiali. Tale distanza può

essere ridotta adottando misure di riduzione della deriva secondo le istruzioni del Servizio di omologazione.

11 Al massimo 3 trattamenti per cultura con un intervallo di almeno 7 giorni.

12 Termine di attesa di 1 settimana per le patate primaticce.

13 SPa 1: per evitare l'insorgenza di resistenza al massimo 4 trattamenti per coltura con prodotti delli gruppi di principi attivi FRAC numero 3 (DeMethylation Inhibitors, DMI = inibitori della sintesi degli steroli, ISS) o FRAC numero 7 (Succinate Dehydrogenase Inhibitors, SDHI).

CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI UTILIZZATORI:

2 Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi.

3 In caso di applicazione nelle serre, queste vanno aerate a lungo prima di riaccedervi.

TECNICA DI APPLICAZIONE

I. Evitare i residui e provvedere alla pulizia

Non preparare mai un quantitativo di miscela irrorante maggiore del necessario. Svuotare completamente i contenitori, sciacquarli con acqua, versare l'acqua di risciacquo nella miscela irrorante! I residui di miscela irrorante tecnicamente inevitabili vanno diluiti più volte in rapporto 1:10 e distribuiti sulla superficie trattata.

La pulizia deve avvenire immediatamente alla conclusione dell'applicazione.

Se sono previste prolungate interruzioni del lavoro (ad esempio durante la notte) riempire il serbatoio soltanto in maniera tale da poter esaurire completamente la miscela irrorante nell'ultimo viaggio.

Per il lavaggio ottimale del serbatoio raccomandiamo di utilizzare un sistema di pulizia interna continuo. È necessario effettuare un'accurata pulizia preliminare con acqua e successivamente una pulizia con un apposito detergente. Distribuire l'acqua di lavaggio sull'area precedentemente trattata.

Non contaminare le acque e le fognature con l'acqua di lavaggio del contenitore.

II. Preparazione della miscela irrorante

1. Riempire il serbatoio per 2/3 di acqua.

2. Agitare Dagonis prima dell'uso e versarlo nel serbatoio con l'agitatore in funzione.
3. Aggiungere eventuali altri prodotti.
4. Riempire il serbatoio d'acqua.

Quantitativo d'acqua: **100 - 300 l/ha**
Durante l'applicazione di miscele irroranti è necessario utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale.

III. Irrorazione

Verificare regolarmente le attrezzature per l'irrorazione al banco di prova.
Prima del trattamento verificare la capacità dell'attrezzatura e controllare la portata degli ugelli.
Durante gli spostamenti e durante l'irrorazione tenere in movimento la miscela irrorante con l'agitatore o con il sistema di ricircolo. Dopo un'interruzione del lavoro rimescolare accuratamente la miscela irrorante.

Bagnare le piante in modo uniforme. Evitare il sovradosaggio e la deriva.

Se durante l'applicazione della miscela irrorante non è possibile evitare il contatto con il prodotto fitosanitario (ad esempio con il prodotto nebulizzato), è necessario utilizzare guanti di protezione, indumenti protettivi, calzature resistenti e altri dispositivi di protezione adeguati (ad esempio visiera, copertura per il capo).

Miscibilità

Dagonis è miscibile con fungicidi, ad esempio Orvego®, Forum®, Infinito®[1], Revus®[2], Ranman®[3] Top e insetticidi, ad esempio Audienz®[4].
Decliniamo ogni responsabilità per effetti negativi provocati dalla miscelazione in serbatoio di componenti da noi non raccomandati.
Distribuire le miscele immediatamente con l'agitatore in funzione.
Se si aggiungono alla miscela nel serbatoio altri prodotti, attenersi agli ambiti di applicazione e alle disposizioni per l'uso di tali prodotti fissate e autorizzate dall'autorità preposta all'omologazione.

Indicazioni per la conservazione

Conservare sempre i prodotti fitosanitari in un locale asciutto, protetto dal gelo. In particolare, nel caso di conservazione di confezioni non sigillate assicurarsi che il contenitore venga accuratamente richiuso dopo il prelievo del prodotto.

INDICAZIONI PER LA MANIPOLAZIONE SICURA

Simboli e indicazioni di pericolo:

Classificazione ed etichettatura in conformità al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Simboli e indicazioni di pericolo:

Identificatore chiave	GHS07	GHS08	GHS09
Simbolo			
Indicazione di pericolo	Attenzione pericolo	Pericoloso per la salute	Pericoloso per l'ambiente acquatico

Avvertenza: Attenzione

Indicazioni di pericolo:

EUH 401	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H362	Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P101	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P103	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
SP 1	Non contaminare l'acqua con il prodotto e/o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. / Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]

Consigli di prudenza (Prevenzione):

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

P261 Evitare di respirare la nebbia o i vapori.

P263 Evitare il contato durante la gravidanza/l'allattamento.

P264 Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi.

Consigli di prudenza (Reazione):

P308 + P311 IN CASO di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P333 + P311 In caso di irritazione o eruzione cutanea: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P364 + P364 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P321 Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

Consigli di prudenza (Conservazione):

P405 Conservare sottochiave.

Consigli di prudenza (Smaltimento):

P501 Smaltire il prodotto/recipiente con i rifiuti pericolosi.

NUMERO DI EMERGENZA IN CASO DI AVVELENAMENTO:

Tox Info Swiss, telefono 145 o 044 251 51 51.

Per istruzioni sulle corrette procedure da seguire in caso di emergenza (ad esempio in caso di incendio, incidenti, ecc.) è a disposizione 24 ore su 24 la centrale operativa dei vigili del fuoco di stabilimento BASF di Ludwigshafen: tel.: 0049-621-604 33 33.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Non riutilizzare i contenitori vuoti.
Pulire accuratamente i contenitori vuoti e consegnarli alle società addette alla raccolta dei rifiuti.
Per lo smaltimento consegnare i residui dei prodotti fitosanitari nel contenitore originale in un centro comunale per la raccolta dei rifiuti speciali o al rivenditore.
Evitare qualsiasi forma di contaminazione dell'acqua con il prodotto, residui della miscela, acqua di lavaggio e deriva.
È vietato riutilizzare il contenitore.

INDICAZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE / RESPONSABILITÀ

I dati contenuti in queste informazioni di prodotto si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze attuali e sono conformi alle disposizioni dell'autorità preposta all'omologazione. A causa della molteplicità di fattori che possono influire sulla lavorazione e sull'uso dei nostri prodotti, queste informazioni non sollevano l'utilizzatore dall'onere di condurre le proprie analisi e i propri test. Poiché la conservazione e l'applicazione sono al di fuori del nostro controllo e non possiamo prevedere tutte le circostanze che si possono eventualmente verificare, decliniamo ogni responsabilità in caso di danni derivati da conservazione e applicazione non corrette.
L'uso del prodotto in ambiti di applicazione non descritti nelle informazioni di prodotto, in particolare su colture diverse da quelle indicate, non è stato da noi verificato. Questo vale in particolare per usi da noi non raccomandati sebbene previsti o approvati dall'autorità preposta all'omologazione. Decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivati da tali usi.
Molteplici fattori, in particolare legati a specifiche condizioni locali o regionali, possono influenzare l'efficacia del prodotto. Tra questi rientrano ad esempio condizioni

atmosferiche e condizioni del terreno, varietà di colture, avvicendamento colturale, momenti di intervento, quantità utilizzate, miscelazione con altri prodotti non conformi ai dati di miscibilità sopra indicati, insorgenza di organismi resistenti ai principi attivi (ceppi fungini, piante, insetti), tecnica di irrorazione, ecc. In condizioni particolarmente sfavorevoli si può pertanto verificare una variazione dell'efficacia del prodotto e non si possono escludere danni alle colture. Per tali conseguenze noi e i nostri partner commerciali decliniamo qualsiasi responsabilità. L'utilizzatore del nostro prodotto è tenuto sotto la propria personale responsabilità al rispetto di eventuali diritti di proprietà intellettuale, delle leggi e disposizioni in vigore, delle disposizioni dettate dall'autorità preposta all'omologazione del prodotto e delle informazioni di prodotto. Tutti i dati e le informazioni qui contenuti possono variare senza preavviso.

® = Marchio registrato di BASF

®[1] = Marchio registrato di Bayer

®[2] = Marchio registrato di Syngenta

®[3] = Marchio registrato di ISK Biosciences

®[4] = Marchio registrato di Corteva