



**Cantus<sup>®</sup>**

**Produktblatt**

## **Schutz gegen Botrytis und Sekundärpilze**

### **Vorteile auf einen Blick**

- Sichere und lang anhaltende Botrytiswirkung
- Zusatzwirkung gegen Oidium und Sekundärpilze (z. B. Penicillium)

 **BASF**  
We create chemistry


BASF Schweiz AG · Pflanzenschutz · Klybeckstrasse 141 · 4057 Basel · SCHWEIZ · [www.agro.basf.ch](http://www.agro.basf.ch)

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

# Cantus® – Systemische Verteilung und Depotbildung für beste Wirksamkeit

Aufgrund der Wirkungsbreite von Boscalid besitzt Cantus® nicht nur eine sichere und lang anhaltende Botrytiswirkung, sondern auch eine sehr gute Zusatzwirkung gegen Oidium und Sekundärpilze. Der systemische Wirkstoff kann von der Pflanze

aufgenommen und mit dem Saftstrom verteilt werden. Durch diese Art der Verteilung wird ein ausgezeichneter fungizider Schutz erreicht. Der auf der Pflanzenoberfläche verbleibende Wirkstoff schützt zusätzlich vor erneuter Sporenkeimung.



## Produktprofil Cantus®

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Wirkstoff</b>         | Boscalid (500 g/kg)  |
| <b>Wirkstoffklasse</b>   | Carboxamide (SDHI)   |
| <b>Formulierung</b>      | Wasserdispergierbares Granulat (WG)  |
| <b>Zulassung</b>         | Graufäule ( <i>Botrytis cinerea</i> )  |
| <b>Zusatzwirkung</b>     | Echter Mehltau und Sekundärpilze (z. B. <i>Penicillium</i> )   |
| <b>Aufwandmenge</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Konzentration: 0.1 %</li> <li>■ Aufwandmenge: 1.2 kg/ha</li> <li>■ Aufwandmenge bezieht sich auf eine Behandlung der Traubenzone sowie eine Referenzbrühmenge von 1.200 l/ha</li> </ul> |
| <b>Anwendung</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Max. 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr</li> <li>■ Letzte Behandlung bei Beginn des Farbumschlags, jedoch spätestens Mitte August</li> </ul>  |
| <b>Wirkungsweise</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vorbeugend (protektiv)</li> </ul>   |
| <b>Nützlingsschonung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raubmilben: nicht schädigend</li> </ul>   |

## Gezielte Botrytisbekämpfung – Unsere bewährte Anwendungsempfehlung

Optimaler Termin für die **Anwendung von Cantus® gegen Botrytis ist „Vor Traubenschuss“**.

Zu diesem Zeitpunkt wird die Leistungsfähigkeit von Cantus® am besten ausgeschöpft. Besonders bei kompakten Sorten werden so das Stielgerüst und die Ansatzstellen der Beeren vorbeugend mit einem Fungizidbelag versehen und frühe Infektionen im Traubeninneren vermieden.



\* Jedes Botrytizid nur 1 x pro Saison einsetzen – stets auf Wirkstoffwechsel achten!