Mit Caryx® im Herbst die Basis für höchste Erträge legen

Produktprofil

Wirkstoffe	30 g/l Metconazol + 210 g/l Mepiquatchlorid
Formulierung	Wasserbasiertes Konzentrat (SL), speziell für Raps entwickelt
Wirkungsweise	Fungizid und Wachstumsregulator systemische Verteilung beider Wirkstoffe in der Pflanze, vorbeugend und heilend
Zugelassene Aufwandmenge	Max. 1 Behandlung pro Kultur Max. 1,4 l/ha pro Applikation
Wasseraufwandmenge	200–400 l/ha
Indikationen	Erhöhung der Standfestigkeit und Verbesserung der Winterfestigkeit; Bekämpfung der Wurzelhals- und Stengelfäule (Phoma)
Anwendungstermin	Herbst (ES 13–27) oder Frühjahr (ES 30–31)

Anwendungsempfehlung



Entwicklungsstadien nach BBCH

*Maximal eine Behandlung in der Kultur: Herbst oder Frühjahr.

150 Jahre

BASF
We create chemistry

- Sichere Überwinterungsleistung
- Optimale Wurzelausbildung
- Gleichmäßige Entwicklung, stärkere Verzweigung
- Zuverlässige Phomawirkung

Bester Schutz vor dem Winter – Basis für höchste Erträge

Caryx®



Gleichmäßige Entwicklung und kompakter Wuchs

2 Tage nach Applikation

21 Tage nach Applikation

50 Tage nach Applikation

Homogen entwickelte Bestände (nach ungleichmäßigem Auflauf) – Applikation von 0,7 l/ha Caryx® im 2- bis 4-Blatt-Stadium

Sichere Überwinterungsleistung

Nach dem Winter: Lückiger Bestand durch Auswinterung

Nach dem Winter: Voller Bestand durch beste Winterfestigkeit

® = registrierte Marke der BASF

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.